



Instrucciones de preparación para la colonoscopia

Preparación intestinal en dosis divididas de Colyte/GoLytely/NuLytely

Antes de su procedimiento	El día antes del procedimiento	El día del procedimiento
<p>Recoja la receta en la farmacia solicitada</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tableta Reglan ▪ Solución de preparación intestinal <p>Compra líquidos claros de tu elección. Estos son líquidos transparentes, a través de los cuales puedas ver, pero <u>NO líquidos rojos ni morados</u>.</p> <p>Ejemplos de lo que NO debe beber: café con crema, leche, jugo de naranja, etc. Si no puede ver a través de él líquido cuando lo pone a contraluz, NO lo beba.</p> <p>Establezca conversación con el personal quirúrgico de qué medicamentos puede continuar durante el proceso de preparación intestinal.</p> <p>Organice su transporte. No se le permitirá conducir usted mismo a casa. No se permite el transporte público a casa a menos que esté acompañado por un adulto responsable. No tienes permitido caminar a casa.</p> <p>Si no puede asistir a su cita/procedimiento programado o si tiene preguntas, llame al 509-488-2636, si no reciben su llamada, deje mensaje. Para necesidades urgentes fuera del horario de trabajo, llame al 509-488-2636 y pregunte por la enfermera a cargo.</p>	<p>Mezcle la preparación intestinal según las instrucciones del frasco.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Después de mezclar, puede colocar la solución preparada en el refrigerador. <p>No se permiten alimentos, productos lácteos ni líquidos rojos o morados durante todo el día.</p> <p>Preparación intestinal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5:30 p. m.-tome la tableta de Reglan de 10 mg por vía oral ▪ 6:00 p. m.-comience a tomarse la solución de preparación intestinal preparada (3 litros) ▪ Beba rápidamente 8 oz (1 taza) cada 10 minutos ▪ Si vomita, espere 30 minutos y luego comience a beber la solución en porciones de 6 onzas cada 15 minutos. ▪ Refrigere el (1) litro restante de solución de preparación intestinal para tomárselo el día de su procedimiento. <p>Puede seguir bebiendo líquidos claros hasta la medianoche. Sin alimentos sólidos</p> <p>Es probable que la primera evacuación intestinal comience aproximadamente 1 hora después del primer vaso de solución de preparación intestinal. Las deposiciones continuarán entre 1 y 2 horas después de terminar el último vaso de solución de preparación intestinal. Las heces deben comenzar a volverse acuosas y claras, amarillas o verdes.</p>	<p>5 horas antes de su procedimiento, termine la solución restante</p> <p>NO coma nada, ni siquiera chicles y mentas.</p> <p>Puede tomar unos pequeños sorbos de agua hasta dos horas antes del procedimiento. No exceda cuatro onzas.</p> <p>Tome los medicamentos aprobados con pequeños sorbos de agua.</p> <p>Todas las mujeres, entre 10 y 55 años, necesitarán una prueba de embarazo en orina. Este se recogerá durante el proceso de admisión. Se excluyen aquellas que hayan tenido una histerectomía.</p>